

Surveillance de la perfusion à domicile

1 Surveiller le bon dégonflement du ballon

Une surveillance toutes les heures suffit pour vérifier que le médicament circule bien dans le tubulure.
Si le ballon ne se dégonfle pas

- **Téléphoner** à l'infirmière.

2 Surveiller la voie d'abord (site d'injection). Si une douleur, un gonflement ou une sensation de chaleur survient au niveau du site d'injection :

- **Clamper immédiatement la tubulure** comme vous l'a préalablement expliqué votre infirmière.
- **Téléphoner** à l'infirmière.

3 Si vous constatez une modification de votre état général : malaise, fièvre, difficulté à respirer, palpitations :

Ceci peut être dû à la perfusion. De très rares cas de réactions allergiques, de réactions type hypertension, ralentissement ou augmentation du rythme cardiaque, ont été décrits. Normalement, les patients à risque sont exclus des perfusions à domicile. Si toutefois cela devait se produire :

- **Clamper immédiatement la tubulure** comme vous l'a préalablement expliqué votre infirmière.
- **Téléphoner** à l'infirmière et composer le **15**.

Dans tous les cas, votre infirmière) assure une surveillance téléphonique et se déplace si besoin pendant la perfusion.



Fiche d'informations Patient



19 bis, rue de la République
54510 TOMBLAINE

- **Tel :** 03 83 30 27 76 • **Fax :** 03 83 30 26 17
- **Web :** <http://www.lorsep.org>
- **Mail :** lorsep@wanadoo.fr

0405 201629 - 0405 201629 - 0405 201629



Groupes Lorrain pour la Prise en Charge
des Patients atteints de
Sclérose en Plaques

Les perfusions de Solumédrol® permettent de réduire la durée des poussées de sclérose en plaques.

L'action n'est cependant pas immédiate.

Afin d'éviter une hospitalisation et de favoriser votre autonomie, il est possible de réaliser cette perfusion à votre domicile sur avis de votre médecin.

Pour votre confort, le réseau LORSEP vous assure la disposition à domicile du traitement. Ces actes sont pris en charge à 100%.

Le prestataire va vous contacter : donnez lui les noms de votre infirmière et pharmacien. Il se charge de chercher vos médicaments et de prévenir l'infirmière.

- C'est l'infirmière qui pose qui sera chargée de la surveillance de la perfusion qui va durer environ 3h.

- Pour vous assurer plus d'autonomie, elle utilisera un diffuseur portable. Ce dispositif pourra être mis dans une poche de pantalon, ou dans une ceinture banane le temps de la perfusion.

- La perfusion peut ainsi s'effectuer quelque soit la position adoptée.

Effets secondaires

- Ce traitement est excitant, la perfusion sera donc effectuée le matin.

Il peut avoir des répercussions sur votre sommeil et vous rendre irritable. Cet effet diminue dans les jours qui suivent le traitement.

- Vous pouvez ressentir une sensation de chaleur et avoir le visage qui rougit un peu durant la perfusion.

- Souvent, ce traitement peut perturber le goût. Cet effet est très temporaire.

Coordination LORSEP

- Le réseau met à disposition des professionnels des référentiels pour que le soin se passe dans les meilleures conditions.

- Une fiche de suivi infirmier est remplie et envoyée au réseau. Le réseau renvoie un compte rendu au médecin.

- Une évaluation de votre satisfaction sera faite par l'infirmière du réseau.

Pour tout complément d'information sur les perfusions vous pouvez joindre l'infirmière ou le pharmacien du Lorsep au 03 83 20 27 78.



Conseils pratiques

- Ne rester pas seul durant l'injection si possible pour éviter tout stress.

- Ne prenez aucun traitement en plus de votre traitement habituel sans en informer votre médecin. Évitez les autres anti-inflammatoires et l'aspirine.

- Restez au calme et évitez de faire des efforts physiques et de vous déplacer à l'extérieur durant la perfusion.

- Votre infirmier(e) va vous expliquer comment surveiller votre perfusion après la pose.